

MEDSEPT-SKIN
(Higieninei ir chirurginei odos dezinfekcijai)

PASKIRTIS:

- Veiksminga, plataus veikimo spektro priemonė alkoholių pagrindu higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai bei pacientų odos dezinfekcijai prieš injekcijas ir dūrius į periferines kraujagysles.
- Rankų ir kojų grybelinių susirgimų profilaktikai.
- **MEDSEPT-SKIN** galima naudoti naudoti ligoninių skyriuose, palatose, tualetuose, tvarstomuosiuose, procedūriniuose, visų specializacijų gydytojų kabinetuose, personalo patalpose, funkcinės diagnostikos, intensyvios terapijos, hemodializės, chirurgijos, infekcinių skyriuose, operacinėse, ambulatorijose, laboratorijose, stomatologų kabinetuose, visose kitose gydymo įstaigų patalpose, greitosios pagalbos mašinose, sanitarinėje tarnyboje, namie slaugant ligonius, senus žmones, naujagimius, kosmetikos, farmacinių produktų gamyboje t.y. visur, kur reikia laikytis geros rankų higienos.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI:

- Asmens higienos dezinfekantas (1tipo biocidas).
- Pagaminta alkoholio pagrindu.
- Paruoštas naudoti.
- Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu (tyrimai atlikti EB reglamentuotose laboratorijose).
- Nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų.
- Sudėtyje esantis glicerolis apsaugo odą nuo sudirgimo ir išsausėjimo.
- Veikliosios medžiagos įsiskverbia į giliuosius epidermio sluoksnius, todėl rankos išlieka be mikrobus net ilgai dėvint gumines pirštines.
- Biocido autorizacijos liudijimo Nr. Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-288(A-01VNO233040/C-21-159), galioja iki 29-05-2023.

VEIKIMAS:

MEDSEPT-SKIN atlieka plataus spektro dezinfekcijos poveikį šiems ligų sukėlėjams:

Bakterijoms – *Psiaudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*, *MRSA*, *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium avium* ir kt.

Grybeliams – *A.brasiliensis*, *Candida albicans*.

Virusams - hepatito B virusui (HBV), ŽIV (HIV), hepatito C virusui (HCV), *Herpes simplex*, *Influenza*, *Vaccinia*, *Rota*, *Nora* virusui ir kt. – veikimo laikas 30 sek.



SUDĖTIS:

Veikliosios medžiagos:

Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 42,4 %

Propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30.0 %,

Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0.1 %. Sudėtyje yra glicerolio.

NAUDOJIMAS:

Produktas paruoštas naudojimui.

Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia.

Higieninis rankų dezinfekavimas (pagal EN 1500). Jis atliekamas:

- prieš nedideles intervencijas (prieš endoskopijas, punkcijas, kateterizavimus);
- prieš liečiant rankomis kateterių, drenų įvedimo vietas;
- prižiūrint ligonius su labai nusilpusiu imunitetu
- po kontakto su ligoniais, galinčiais būti infekcijos šaltiniu;

Ant švarių, sausų rankų dozatoriumi užpilti 3 ml preparato ir kruopščiai įtrinti į odą, nagus, pirštus, tarpupirščius, riešus; ekspozicijos laikas – 30 sek.

Chirurginis rankų dezinfekavimas (priešoperacinė antiseptika pagal EN 12791):

Ant švarių, sausų rankų (plaštakų, riešų, dilbių, alkūnių) užpilti reikiamą preparato kiekį (ne mažiau kaip po 3 ml) ir masažuojant įtrinti į odą; priemonę palikti išdžiūti, bent 3 min., procedūrą pakartokite; bendras ekspozicijos laikas – 90 sek.

Odos dezinfekcijai injekcijų, skiepijų, kraujo ėmimo vietoje odą gerai sudrėkinti dezinfekuojančiu skysčiu vienodai sutepant steriliu tamponu, ekspozicijos laikas – 30 sek.

Odos dezinfekcija prieš operacijas, punkcijas sterilių tamponą gerai sumirkyti dezinfekuojančiu skysčiu ir kruopščiai apdoroti operacinę zoną. Leisti išdžiūti. Operacinės zonos dezinfekavimas atliekamas du kartus po 90 sek. Bendras veikimo laikas 3 min.

Kojų **grybelinių susirgimų profilaktikai** avalynę iš vidaus išpurkšti 3 ml preparato ir palaukti kol išdžiūs. Pabuvus vietose kur padidėjusi rizika užsikrėsti kojų grybeliu, apipurkšti kojų pėdas.

Medikamentinio kojų grybelio gydymo metu ir po jo, pakartotiniam užsikrėtimui išvengti, vakarais apipurkšti kojų pėdas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Dėmesio! Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų



saugos ir sveikatos priemonės.

MEDSEPT-SKIN naudokite tik sveikai odai dezinfekuoti.

Nenaudojamas veido odos, žaizdų arba sekreto sankaupos virš žaizdos dezinfekcijai.

FIZIKINĖS-CHEMINĖS SAVYBĖS:

Išvaizda: Bespalvis, skaidrus skystis, turintis natūralų etilo alkoholio kvapą. Priemonei išdžiūvus, kvapo nelieka.

Tankis, g/ cm³: 0,865–0,875

pH: 6,5–7,5

Daugiau informacijos ieškokite produkto saugos duomenų lape.

DARBŲ SAUGOS NURODYMAI:

Pavojinga. Labai degūs skystis ir garai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.



FASAVIMAS IR LAIKYMAS:

Priemonė fasuojama į plastmasinius butelius po 100 ml, 0,5, 1 l su purkštuku (arba be) ir bakelius po 5 l.

Sandėliuojama sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėn. nuo pagaminimo datos. Rekomenduojama

laikymo temperatūra 5–25 °C.

